



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО. ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



Что такое ВИЧ-инфекция? И чем она отличается от СПИДа?



ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека.

ВИЧ-инфекция

ВИРУС	ИММУНОДЕФИЦИТА	ЧЕЛОВЕКА
вызывает заболевание	действует на иммунную систему	живет только в жидкостях организма
ВИЧ разрушает клетки иммунной системы человека. В начале заболевания человек не ощущает дискомфорта и боли. Вирус никак себя не проявляет, но может передаваться другим людям с первых дней заражения.		

СПИД

СИНДРОМ	ПРИОБРЕТЕННОГО	ИММУНОДЕФИЦИТА
набор симптомов	вызванного ВИЧ-инфекцией	разрушает иммунную систему
СПИД — это последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая возникает, если человек не лечится. На его фоне развиваются: туберкулез пневмония онкологические заболевания грибковые инфекции Именно эти болезни чаще всего становятся причиной смерти.		

Как передается ВИЧ?

Вирус иммунодефицита человека передается через 4 жидкости нашего организма:




кровь сперму вагинальную смазку грудное молоко


В них он живет, размножается и чувствует себя абсолютно комфортно, пока жидкости не попадают во внешнюю среду.

Вне организма человека вирус погибает под влиянием воздуха, в воде, в мыльном растворе и других средах. Для одной-двух капель любой из этих жидкостей достаточно 1 минуты на открытом воздухе, чтобы вирус погиб.

Меня это касается?



Первая по заболеваемости группа — это люди 30–40 лет. Вторая по заболеваемости группа — это люди 40–50 лет. Молодые люди 20–30 лет на третьем месте.



Более половины новых случаев инфицирования происходит через половой контакт между мужчиной и женщиной.

1 млн

Почти 1 миллион россиян живет с ВИЧ-инфекцией.

Вирус НЕ МОЖЕТ попасть в организм в следующих случаях:

- через слюну при поцелуе, кашле, чихании
- через рукопожатия и объятия, даже если на коже есть царапины и мелкие порезы
- в общих душевых или в бассейне
- через капли крови или другие жидкости на полу, раковине и других поверхностях
- через укусы животных
- через насекомых

Какими способами вирус **МОЖЕТ** попасть в организм и что делать, чтобы вирус **НЕ ПОПАЛ** в мой организм?

Незащищенный секс



Используйте презерватив. Он защищает, если вы:

- смотрите на срок годности
- проверяете целостность упаковки
- соблюдаете правила хранения
- используете смазки только на водной основе

Попадание вируса прямо в кровоток, например через иглу



Следите за тем, чтобы шприцы и иглы были одноразовыми всегда и везде (дома, в тату-салонах, в кабинете косметолога и т.д.)



От матери к ребенку при беременности, родах и грудном вскармливании



Принимайте курс лечения, назначенный врачом, непрерывно и откажитесь от грудного вскармливания. В таком случае, если у будущей матери установлен диагноз ВИЧ-инфекции, ребенок родится без него

У вас есть 72 часа, чтобы не заболеть!

Отсчет времени начинается с момента ситуации риска, например незащищенного секса.



Срочно обратитесь в свой региональный Центр СПИД.



Получите рекомендации врача для экстренной профилактики.



Сходите в аптеку за лекарствами. Если их не оказалось, выясните, где вы можете заказать лекарства в кратчайший срок, чтобы с момента возможного заражения до первого приема прошло не более 72 часов.



Пройдите весь курс лечения, прописанный врачом без перерывов. Обычно курс профилактики в виде таблеток занимает 4 недели.

Вы должны будете пройти **экспресс-тест**, который покажет, не было ли у вас ВИЧ-инфекции ранее. Если результат окажется положительным, то будет назначена схема пожизненного лечения. Если отрицательным, вам будет прописано профилактическое лечение, чтобы недавняя ситуация риска не привела к инфицированию.

ДКТИ@РАБОТЕ



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rosmintrud.ru



КОНТАКТЫ ЦЕНТРА СПИД В ВАШЕМ РЕГИОНЕ
o-spide.ru

